

国际计生联医学期刊

目录

孕产妇死亡和不安全流产：可预防但仍持续存在	
Lale Say, Iqbal Shah	1
避孕措施在产科治疗中的应用	
Nathalie Maulet, Jean Macq, Pierre Buekens	3

孕产妇死亡和不安全流产：可预防但仍持续存在

Lale Say, Iqbal Shah

减少孕产妇死亡和患病既是一种人权，也是一个公共健康的使命。在2000年联合国千年首脑会议上通过的八项联合国（UN）千年发展目标（MDGs）¹之一就是改善孕产妇健康，其中一项目标就是在1990年到2015年间将孕产妇死亡率（每100,000活产死亡的孕产妇数量）减少3/4。

本文显示了孕产妇死亡率和不安全流产的全球和区域性水平和趋势。不安全流产占全球孕产妇总死亡数的13%，但在很多国家所占比例远大于这一数字。²我们首先报告孕产妇死亡率的信息，然后介绍不安全流产。

孕产妇死亡：水平和趋势

孕产妇死亡定义为：“妊娠中或产后42天内死亡的妇女，与妊娠的时间和部位无关，可源于任何与妊娠相关或妊娠后加重、或与其治疗有关的原因，但与意外的或偶然的原因无关”³，它是发展中国家中的一个大的公共健康问题。尽管解决这一问题

的进展仍然缓慢，它已成为国际社会的一个关注焦点，尤其是从1987年的安全孕产大会，还包括上述的千年首脑会议以后。

由世界卫生组织（WHO）、联合国儿童基金（UNICEF）、联合国人口基金（UNFPA）和世界银行联合学术界的科学家共同发布的最新孕产妇死亡水平和趋势显示，2005年全世界发生的孕产妇死亡总数约为536,000例。其中533,000例发生在发展中国家。⁴发生在亚撒哈拉非洲这一地区的孕产妇死亡数（270,000）超过了一半，其后是南亚（188,000）。这两个区域占全球孕产妇死亡的86%。

千年发展目标（MDG）的目标清楚地表明是要减少孕产妇的死亡率。在2005年，孕产妇的死亡率在发展中国家约为450，与发达区域（9）和独联体国家（51）相比有显著的差异。该情况在不同区域的发展中国家是不同的，最高的孕产妇死亡率是在亚撒哈拉非洲的100,000分之900，最低的是东亚的100,000分之50（见表1）。在全世界，孕产妇死亡比例在1,000以上的有14个国家，其中13个（除外阿富汗）在亚撒哈拉非洲地区。全世界孕产妇死亡率最高的是在塞拉利昂（每100,000活婴中2,100），与之形成鲜明对照的是爱尔兰的孕产妇死亡率仅为1。

孕产妇死亡率表示每一名妇女每次妊娠的死亡风险。在高的国家，如亚撒哈拉非洲，每个妇女将会多次面临这种危险。在非洲，一个15岁妇女最终死于妊娠原因的机会最高（孕产妇死亡的终生风险），达1/26，而在发达国家，其风险约为1/7,300（见表1）

达到MDG对孕产妇死亡率的目标需要孕产妇每年的死亡率要有5.5%左右的下降。对1990-2005年的趋势分析显示，世界上没

图1. 各个地区的孕产妇死亡率，1990和2005年

