

Підтримка аборту **мізопростолом** **лише** до 12-13 тижнів

Адаптовано з Тренінгу щодо медикаментозного аборту для медпрацівників



Крок 1

Покладіть 4 пігулки мізопростолу (дозуванням 200 мкг кожна) під язик або між щокою та яснами і потримайте їх там протягом 30 хвилин, доки вони не розчиняться.

Протягом цих 30 хвилин заборонено розмовляти чи їсти. Через 30 хвилин можна випити невелику кількість води та проковтнути все, що залишилося від пігулок. Це також сприятливий час, щоб прийняти знеболювальний засіб, наприклад, ібупрофен, оскільки невдовзі розпочнуться спазми. Після прийому першої дози мізопростолу жінкам слід користуватись гігієнічною прокладкою, що підходить для рясної кровотечі.

Пігулки мізопростолу також можна вводити у піхву, але це не рекомендується в умовах, коли жінка може бути притягнута до кримінальної відповідальності за аборт, оскільки фрагменти пігулки можуть залишатися у піхві до чотирьох днів, і можуть бути виявлені медичними працівниками, якщо жінці потрібно звернутися за медичною допомогою.

Який би спосіб застосування мізопростолу жінка не обрала, його слід використовувати таким же чином для приймання будь-яких додаткових доз.




Крок 2



Крок 3

Прийміть ще 4 пігулки мізопростолу (дозуванням 200 мкг кожна)

таким же чином, як приймали початкову дозу (або під язик, або між щокою та яснами, або у піхву), дотримуючись тих самих інструкцій, що зазначені вище.



Крок 4



Крок 5

Прийміть ще 4 пігулки мізопростолу (дозуванням 200 мкг кожна)

якщо кровотеча не почалася або якщо незрозуміло, чи відбувся аборт, Вона має прийняти ці пігулки таким же чином, як приймала початкову дозу (або під язик, або між щокою та яснами, або у піхву), дотримуючись тих самих інструкцій, що зазначені вище.

Хоча деяким жінкам і потрібні додаткові дози мізопростолу для завершення аборту (якщо кровотеча не починається протягом 24 годин після прийому третьої дози мізопростолу або якщо незрозуміло, чи відбувся аборт), в такому випадку жінці слід порадити звернутися за консультацією до вас чи іншого медичного фахівця.

